

Numerische Mathematik I für Ingenieure SS15

Verständnisfragen – Hausübung 3

VF-1:		
1.	Je besser die Kondition eines Problems, desto stabiler sind Algorithmen zur Lösung dieses Problems.	falsch
2.	Bei einem stabilen Algorithmus ist der Ausgabefehler nicht viel größer als der Eingabefehler.	falsch
3.	Die Funktion $f(x) = \ln(x)$ ist gut konditioniert für alle x mit $ x - 1 \ll 1$.	falsch
4.	Die Funktion $f(x, y) = x e^{4y^2}$ ist gut konditioniert für alle (x, y) mit $x^2 + y^2 \leq 0.1$.	wahr

VF-2:		
1.	Es seien $x = \frac{1}{3}$ und $y = \frac{1}{3} + \pi 10^{-10}$. Bei der Berechnung von $(x + y)(x - y)$ in $\mathbb{M}(10, 12, -99, 99)$ tritt Auslöschung auf.	wahr
2.	Es seien $x = \frac{1}{3}$ und $y = \frac{1}{3} + \pi 10^{-10}$. Bei der Berechnung von $\sin(x) - \sin(y)$ in $\mathbb{M}(10, 12, -99, 99)$ tritt Auslöschung auf.	wahr
3.	Die Funktion $f(x, y) = x + y$ ist für alle (x, y) mit $(x, y) \neq (0, 0)$ gut konditioniert.	falsch
4.	Es seien $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ beliebig aber regulär und $\kappa(A)$ die Konditionszahl der Matrix A . Dann gilt $\kappa(A^{-1}) = \kappa(A)^{-1}$.	falsch

VF-3: rechte Seite $b \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt für das zugehörige lineare Gleichungssystem $Ax = b$:		
1.	Das Problem ist immer gut konditioniert.	falsch
2.	Bei Störung der Eingabedaten A und b wird der relative Fehler in der Lösung in Abhängigkeit vom relativen Eingabefehler maximal durch den Faktor $\kappa(A)$ verstärkt.	falsch
3.	Die Lösung des linearen Gleichungssystems kann immer mit dem Standard-Gauß-Algorithmus (ohne Spaltenpivotisierung) berechnet werden.	falsch
4.	Zeilenäquilibration verbessert immer die Kondition der Matrix A bezüglich der 2-Norm.	falsch

VF-4: Seien A, B beliebige $n \times n$ -Matrizen mit reellen Einträgen. Weiter sei $\ \cdot\ $ eine Matrixnorm. Beantworte alle Fragen mit wahr oder falsch.		
1.	$\ A + B\ \leq \ A\ + \ B\ .$	wahr
2.	$\ A - B\ \leq \ A\ - \ B\ .$	falsch
3.	$\ \lambda A + \mu B\ \leq \lambda \ A\ + \mu \ B\ , \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$	falsch
4.	$\ AB\ \leq \ A\ \ B\ .$	wahr

VF-5: Gegeben sei die Matrix $A = \begin{pmatrix} -2 & 14 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$. Beantworte alle Fragen mit wahr oder falsch!		
1.	$\ A\ _\infty = 12$	falsch
2.	$\ A\ _1 = 20.$	wahr
3.	A ist regulär.	wahr
4.	Für eine beliebige rechte Seite $b \in \mathbb{R}^2$ besitzt $Ax = b$ eine eindeutige Lösung x .	wahr

VF-6: Gegeben seien die Matrizen A und \tilde{A} mit $\tilde{A} \approx A = \begin{pmatrix} 123 & 0.12 \\ 1.23 & 12.3 \end{pmatrix}$. Alle Zahlen in A sind auf drei signifikante Ziffer gerundet. ΔA sei die größtmögliche Abweichung für $A - \tilde{A}$. Beantworte alle Fragen mit wahr oder falsch!		
1.	$\ \Delta A\ _1 = 0.505$	wahr
2.	$\ \Delta A\ _\infty = 0.505$	falsch
3.	$\ A\ _1 = 124.23$	wahr
4.	Für den relativen Fehler von A gemessen in der 1-Norm gilt $r_{A1} \approx 0.004$	wahr